



Nationalparke in Deutschland (nach Bundesamt für Naturschutz Stand: Januar 2022)

Nationalpark	Gründungs- jahr	Gesamtfläche [ha]	vorrangig geschützte Lebensräume
Bayerischer Wald (BY)	1970	24.980	Buchen-Bergmischwälder mit Tanne, Hochlagen-Fichtenwälder, Moore, Bergbäche, Blockhalden
Berchtesgaden (BY)	1978	20.804	Alpine Felsschuttfuren, Rasengesellschaften und Latschen-Gebüsche, subalpine, montane und submontane Wälder, Almweiden, Seen
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer (SH)	1985	441.500 davon ca. 99,5% Wasserfläche*	Wattenmeerökosysteme, Salzwiesen des Vorlandes, Sandbänke und Dünen
Niedersächsisches Wattenmeer (NI)	1986	345.000 davon ca. 94% Wasserfläche*	Wattenmeerökosysteme, Salzwiesen und Dünen der Ostfriesischen Inseln
Hamburgisches Wattenmeer (HH)	1990	13.750 davon ca. 97,5% Wasserfläche*	Wattenmeer im Mündungsgebiet der Elbe mit starkem Gezeiten- und Brackwassereinfluss
Jasmund (MV)	1990	3.070 davon ca. 20% Wasserfläche	Buchenwälder auf Kreidestandorten, Moore, Kreidesteilküste, küstennahe Ostsee
Harz (ST/NI)	1990/1994	24.732	Hochlagen-Fichtenwälder, Buchenwälder, Moore, Bergwiesen, Blockhalden und Felsformationen, Fließgewässer
Sächsische Schweiz (SN)	1990	9.350	Sandsteinfelsen, submontane wärme- und trockenheitsliebende Wälder, Schlucht- und Schatthangwälder
Müritz-Nationalpark (MV)	1990	32.200	Kiefern- und Buchenwälder, Erlen- und Birkenbruch, Seen, Röhrichte, Moore



Nationalpark	Gründungs- jahr	Gesamtfläche [ha]	vorrangig geschützte Lebensräume
Vorpommersche Boddenlandschaft (MV)	1990	78.600 davon ca. 83% Wasserfläche*	Boddengewässer, Salzwiesen, Dünen und Röhrichte, Kiefern- und Buchenwälder, Trockenrasen
Unteres Odertal (BB)	1995	10.323	Flussauenlandschaft, Altarme und -wasser, Ried- und Röhrichtbestände, Feuchtgrünland, Hangwälder, Steppenrasen
Hainich (TH)	1997	7.513	Laubmisch- und Buchenwälder mittlerer und reicherer Standorte in unterschiedlichen Sukzessionsstadien
Eifel (NW)	2004	10.770	Atlantisch geprägte, bodensaure Buchenmischwälder (kollin bis submontan), Magerweiden, Felsen, Urft-Stausee
Kellerwald-Edersee (HE)	2004	7.688	Submontane, bodensaure Buchenwälder, felsig-trockene Steilhänge, Eichen-Trockenwälder
Schwarzwald (BW)	2004	10.062	montane fichtenreiche Buchen-Tannen-Mischwälder, Hochheiden
Hunsrück-Hochwald (RP/SL)	2015	10.230	bodensaure Buchen- und Eichenwälder, Fichtenforste, Blockschutthalden und Hangmoore

*) betrifft nur den Wasseranteil, der nicht zur statistisch erfassten Landfläche gehört

Quelle: <https://www.bfn.de/nationalparke>